





Ścieżka edukacyjna „Płazy”



Ścieżka edukacyjna

„Płazy”

- ❖ Długość ścieżki: 4,2 km
- ❖ Czas przejścia: około 2,5 godz.
- ❖ 6 przystanków



Ścieżka edukacyjna „Płazy” zlokalizowana jest we wschodniej części Wigierskiego Parku Narodowego, przebiega wśród pól, łąk i zabagnień położonych w okolicy wsi Rosochaty Róg. Przystanki na ścieżce są rozmieszczone na środkowym odcinku ścieżki, na dystansie ok. 0,5 km.

Płazy są zwierzętami ziemnowodnymi, występującymi w strefie klimatycznej gorącej i umiarkowanej. Posiadają wiele cech wskazujących na przystosowanie się do życia w dwóch środowiskach. Larwy płazów żyją w środowisku wodnym natomiast postacie dorosłe przebywają głównie na lądzie, pozostając jednak w mniejszym lub większym stopniu związane z wodą.

Przystanki:

TABLICA POCZĄTKOWA - znajduje się przy przystanku PKS w Czerwonym Folwarku.

KUMAK - znajduje się tu miejsce rozrodu kumaka nizinnego. Okres jego godów przypada w maju, czerwcu i lipcu. Można wówczas usłyszeć wydawane przez samce dźwięki przypominające monotonne stęknienia lub wielokrotnie powtarzaną głoskę „U”.

GRZEBIUSZKA - bywa ona potocznie nazywana żabą czosnkową, ponieważ podrażniona wydziela zapach czosnku. Jest jedynym rodzimym płazem posiadającym pionową żrenicę oka. Kijanki grzebiuszki są największe spośród wszystkich krajowych płazów, osiągają długość 10-18 cm.

ŻABA MOCZAROWA - posiada zdolność zmiany ubarwienia w zależności od warunków środowiska. Dymorfizm płciowy jest bardzo wyraźny w porze godowej. U samców skóra staje się gruba i gąbczasta, a grzbiet przyjmuje charakterystyczną błękitną barwę.

ŻABA JEZIORKOWA - jest najmniejsza spośród trzech polskich żab zielonych. Żaba jeziorkowa jest ściśle związana ze środowiskiem wodnym, gdzie przebywa przez większość swojego życia. Drewniana kładka biegnąca wzdłuż stawu i niewielki pomost umożliwiają obserwację tych płazów.

ŻABA TRAWNA - jest to najpospolitszy gatunek płaza na terenie WPN. Należy ona, podobnie jak żaba moczarowa, do żab brunatnych. Grzbiet ciała ma brązowy z nieregularnymi plamami, natomiast część brzuszna jest jasna i pokryta plamkami w kolorze brązowym, czerwonym lub różowym.

TRASZKA ZWYCZAJNA - jest najpospolitszym w Polsce płazem ogoniastym. Oprócz niej na obszarze Parku spotyka się też większą traszkę grzebieniastą. Skóra traszki jest cienka i delikatna, ogon nieco dłuższy od reszty ciała.

Turysto! Pamiętaj o wykupieniu karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego!

Karty wstępu można zakupić przez internet na stronie:
wpn.eparki.pl/w1
wpn-m.eparki.pl/w1 (wersja na urządzenia mobilne)

