

**Toposedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca
Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania
obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami
pierwotnego lasu puszczańskiego - etap III**

Nazwa działania	Opis działania
Inwentaryzacja wątrobowca <i>Cephalozia catenulata</i>	Przeprowadzenie inwentaryzacji <i>Cephalozia catenulata</i> na wszystkich potencjalnych siedliskach, na których można się spodziewać tego wątrobowca, wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Rejestracja zmiennych mikrosiedliskowych (temperatura, wilgotność powietrza)	Pobranie z 20 rejestratorów Hobo U23-001 Pro V2 firmy Onset, zainstalowanych w poprzednim roku, danych na temat wilgotności i temperatury powietrza.
Opracowanie raportu oraz złożenie do druku publikacji	Analiza statystyczna uzyskanych wyników, opracowanie raportu z badań, złożenie do druku publikacji wykorzystującej wyniki projektu.
Zakup oprogramowania komputerowego wraz z podręcznikami	Zakup oprogramowania komputerowego niezbędne do przeprowadzenia analiz danych ekologicznych uzyskanych wyników (program PC-ORD wraz z podręcznikami).